



# ကလေးဘဝ၏ ပထမအပတ်တွင် မိဘများအတွက် လမ်းညွှန်

## သင့်မွေးကင်းစကလေး နေကောင်းပါရဲ့လား။

### ကျန်းမာသော မွေးကင်းစကလေး၌

- နှုတ်ခမ်းများနှင့် လျှာတို့မှာ ပန်းရောင်ဖြစ်သည်
- ချိုင်းအောက်ရှိ အပူချိန်သည် သင့်နှင့် အလားတူ 36.8 နှင့် 37.3 ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် အကြားရှိသည်
- ပုံမှန် ဆီးသွား (ရှူးရှူးပေါက်) ၍ ဝမ်းသွား (အီးအီးပါ) သည်
- 24 နာရီအတွင်း 8 ကြိမ်မှ 12 ကြိမ် မကြာခဏ အစားစားသည်
- နိုးနေစဉ် တိတ်တဆိတ် နိုးနိုးကြားကြားရှိပြီး အသံများနှင့် မြည်သံများအပေါ် တုံ့ပြန်သည်
- တစ်ခဏ ဆိုင်းငံ့ခြင်းများဖြင့် သင့်ထက် အနည်းငယ် ပိုမြန်ဆန်စွာ အသက်ရှူသည်
- သူတို့ ရုန်းကန်နေရပြီး အကူအညီ လိုအပ်သည့်အခါတွင် အသားအရောင် ပြောင်းလဲခြင်း၊ ငိုယိုနေခြင်း၊ တွန့်လိမ်နေခြင်း သို့မဟုတ် တုန်ယင်နေခြင်းတို့ကဲ့သို့သော လက္ခဏာများကို ဖော်ပြသည်။

**သင့်မွေးကင်းစကလေး ဖျားနာနေပါသလား။**

အကယ်၍ သင့်မွေးကင်းစကလေးသည်

- အသက်ရှူ ရပ်သွားလျှင် သို့မဟုတ် ပြာနှမ်းသွားလျှင်
- မျက်စိများ၊ ပါးစပ်၊ လက်မောင်းများ သို့မဟုတ် ခြေထောက်များ ဆန့်တင်ငင် သို့မဟုတ် ဆတ်ခနဲတို့ခနဲ လှုပ်ရှား၍ လေသင်တုန်းဖြတ်ခဲ့လျှင်
- မနိုးနိုင်လျှင်
- ကျယ်လောင်သော အသံများ၊ သူ၏မျက်လုံးများအပေါ် တောက်ပသော အလင်းရောင် သို့မဟုတ် သူ့လက်မောင်းကို ညင်သာစွာဆိတ်ခြင်းကို သတိမထားမိလျှင်



**အရေးယူဆောင်ရွက်မှု**

**ဆေးရုံတွင်ဆိုလျှင်**  
သင့် သားဖွားဆရာမ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်အား  
**ချက်ခြင်း** ပြောပြပါ သို့မဟုတ် အကူအညီတောင်း  
ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ

**အိမ်တွင်ဆိုလျှင်**  
**000** ကို ဖုန်းဆက်ပါ

## ဘဝ၏ ပထမပတ်အတွင်း

- အကယ်၍ သင့်မွေးကင်းစကလေးသည်
- မွေးဖွားပြီးနောက် ပထမ 24 နာရီအတွင်း အသားရောင်မှာ ဝါနေလျှင်
  - ပထမ 24 နာရီကြာပြီးနောက် 6 နာရီထက်ပိုကြာပြီးနောက် အစားစားပဲနေနေလျှင်
  - ပထမ 24 နာရီကြာပြီးနောက် အနည်းဆုံး အနီးအစို တစ်ခုနှင့် အနီးအညစ် တစ်ခု မလဲရသေးလျှင်
  - မျက်စိ၊ ပါးစပ်၊ လက်မောင်း သို့မဟုတ် ခြေထောက်သည် ဆန့်တင်ငင် သို့မဟုတ် ဆတ်ခနဲတို့ခနဲ လှုပ်ရှားနေလျှင်
  - ခန္ဓာကိုယ်၊ ဦးခေါင်း၊ လည်ပင်း၊ လက်မောင်းများနှင့် ခြေထောက်များမှာ ထောင့် သို့မဟုတ် ပျော့ခွနေပုံဖြစ်လျှင်
  - အလွန်မြန်ဆန်စွာ အသက်ရှူနေပြီး တအိအိ မြည်နေသောအသံများ ထွက်နေလျှင်
  - အားပျော့စွာ၊ အသံဆူးရှစွာ၊ ညည်းညူရှာ သို့မဟုတ် နာကျင်စွာ ငိုခြင်းတို့ကဲ့သို့ မူမမှန် ငိုသံကိုကြားရလျှင်
  - သူ၏ မစင်တွင် သွေးရှိလျှင်
  - အရေပြားမှာ အလွန်ဖြူဖျော့နေလျှင် သို့မဟုတ် အဝါရောင်သို့ ပြောင်းနေလျှင်
  - အသက်ရှူသည့်အခါတွင် သူ၏ ဝမ်းခေါင်း (ဗိုက်) သို့မဟုတ် ရင်ဘတ်အောက်ပိုင်းမှာ ရှိုက်ဝင်သွားနေလျှင်
  - အလွန်အေးအန်နေလျှင် (ဝါ) နောက်ဆုံး 3 ကြိမ်တွင် အစားစားပြီးတိုင်း အစာတစ်ဝက်ကျော်ကျော် အန်နေလျှင်
  - အန်ဖတ်မှာ မကြည်လင်၊ နို့ရည်ရောင် သို့မဟုတ် အဝါဖျော့ရောင်ဖြစ်နေလျှင်



**အရေးယူဆောင်ရွက်မှု**

**ဆေးရုံတွင်ဆိုလျှင်**  
သင့် သားဖွားဆရာမ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်အား  
ပြောပြပါ

**အိမ်တွင်ဆိုလျှင်**

- မိခင်နှင့် ကလေး ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ 24 နာရီလုံး ဖုန်းလိုင်း။ ဖုန်း 13 22 29
- 24 နာရီလုံး သူနာပြု အကူအညီ Nurse-on-Call ဖုန်း 1300 60 60 24
- သင့် အထွေထွေဆရာဝန် (GP) ထံသွားပါ
- ဆေးရုံ အရေးပေါ်ဌာနကို သွားပါ
- အရေးပေါ် ဖြစ်ပါက **000** ကို ဖုန်းဆက်ပါ

ကြည့်လင်	နို့ရည်	အဝါဖျော့	မုန်ညှင်း	အစိမ်း	အစိမ်း	အစိမ်း	အစိမ်း	သွေး
သို့မဟုတ်								
• တစ်စုံတစ်ရာ မှားနေပြီဟု သင်ထင်မှတ်လျှင်								

ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုရန်: ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် ကြည့်ရှုပြီး/သို့မဟုတ် ခေါင်းလှန်လုပ်ပြီး ပုံမှန်သည့်အခါတွင်၊ သင့်စက၏ အပြင်အဆင်များပေါ်မူတည်၍ ယေးပါ အရောင်များ ကွဲပြားနိုင်သည်။

Reference: Morley CJ, Thornton AJ, Cole TJ, Hewson PH, Fowler MA. Baby Check: a scoring system to grade the severity of acute systemic illness in babies under 6 months old. Arch Dis Child. 1991 Jan;66(1):100-5. doi: 10.1136/adsc.66.1.100.