


## Koni biyopsi

Koni biyopsi, koni biçimli bir parça dokunun incelenmek amacıyla rahim boynundan çıkartılmasını içeren küçük bir ameliyattır.



### Koni biyopsinin önerildiği durumlar aşağıda açıklanmaktadır:

- size uygulanmış olan kolposkopide görünümün normal bulunmasına karşın, Pap smear sonuçları sürekli anormal hücreler göstermekte olması. Kolposkopi, doktorun kolposkop denilen bir aygıtla rahim boynuna yakından bakabilmesini sağlayan bir incelemedir. Kolposkop, rahim boynunun büyütülmüş görüntüsünü sağlar. Bununla beraber, bazen hücrelerin rahim boynunun derinliğinde bulunması durumunda, doktor bunları göremeyecektir.
- Pap smear testi ya da biyopsinin, rahim boynunun derinliğinde bulunan anormal beze hücrelerini göstermekte olması.
- uzmanın, anormal hücrelerin çok erken kanser başlangıcı oluşturması konusunda kaygı duyması.

Koni biyopsi, tam ve doğru bir tanılama sağlanmasına yardımcı bulunduğu kadar, çoğu kez etkin bir tedavi yöntemi de oluşturmaktadır. Koni biyopsi sırasında çıkarılan doku, tanıyı doğrulamak ve anormal hücrelerin alınıp alınmadığını kontrol etmek amacıyla dikkatle incelenecektir.

### Ameliyat olacağınız gün

Bu günü birlik ameliyat uygulamasıdır. Buna göre, hastaneye girdiğiniz aynı gün içinde taburcu olacaksınız. Bir kimse tarafından hastaneden alınıp eve götürülmeniz önemle gerekmektedir.

Hastaneye girdiğiniz gün bir uzmanla ameliyat konusunda görüşme olanağınız bulunacaktır. Uzmana sormak istediğiniz hususların bir listesini yapmanız yardımcı olabilir.

Size, uyumanızı sağlayacak olan genel anestezi uygulanacaktır. Anestezinin etkisi geçtikten sonra, aybaşı ağrısı ya da krampları gibi bazı ağrılar duyabilirsiniz.

Kendinizi rahatsız hissetmeniz ya da herhangi bir konuda kaygı duymanız durumunda, hemşirelere bildirin. Hemşireler size yardımcı olmak amacıyla orada bulunmaktadırlar.

### Koni biyopsiden sonra

Koni biyopsiden sonra dinlenebilmeniz için, en iyisi iki gün süreyle işten izin almanız ve aile üyelerinizin ya da arkadaşlarınızın yardımını sağlamanızdır. Bunu izleyen hafta süresince, fazla bedensel etkinliklerden ve özellikle herhangi bir ağırlık kaldırmaktan sakınmanız gerekir.

Bir miktar kanama ve pembemsi akıntınız olabilir. Bunların, aybaşınızda olanlardan daha çok bulunması durumunda, yerel doktorunuz ya da hastanenin acil servisiyle ilişki kurmanız gerekir. Dört hafta süreyle cinsel ilişkide bulunmamanız zorunludur. Biyopsi sonuçlarınızı bildirmek için yaklaşık bir hafta içinde sizi telefonla arayacağız.

### Koni biyopsiden sonra hamilelik

Koni biyopsi, rahim boynunuzu zayıflatabilir ve bu nedenle hamilelikte sorunlar oluşabilir. Koni biyopsiden sonra hamile kalmanız durumunda, bunu doktor ya da ebenize bildirin. Hamileliğiniz süresi içinde özel kontrollardan geçmeniz gerekecektir.



## Koni biyopsi

### Daha fazla bilgi için

#### Dysplasia Clinic Nurse

Royal Women's Hospital  
Kat 1 Güney, Women's Health Clinics  
(Women's Sağlık Klinikleri)  
Grattan St ve Flemington Rd. kavşağı  
Tel: (03) 8345 3548

#### Emergency Care Department

Royal Women's Hospital  
Flemington Road girişi  
Parkville  
Tel: (03) 8345 3636

#### Yadsıma

Royal Women's Hospital, bu bilgi metninde sağlanmış olan ya da ilişki kurulan bilgi ya da tavsiyeler (ya da bu tür bilgi ya da tavsiyelerin kullanımı) bağlamında herhangi bir kimseye karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu bilgileri, erişimde bulunan tüm kişilerin anılan bilgilerin ilgi ve doğruluğunu değerlendirme sorumluluğunu üstleneceği anlayışıyla sağlamış bulunuyoruz. Kadınlar, sağlık gereksinimlerini bir sağlık görevlisiyle görüşmeye özendirilmektedir. Sağlığınızla ilgili kaygılarınızın bulunması durumunda, sağlık bakımınızı sağlayan kurum ya da kişiden tavsiye almanız ya da acil bakım gerekmesi durumunda, en yakın Acil Durum Bölümüne başvurmanız gerekmektedir.

*Ekim 2008 tarihinde yayımlanmıştır.*