




التصوير بالموجات فوق الصوتية مع استخدام محلول ملحي (SIS) والتصوير بالموجات فوق الصوتية الظليلي للرحم وقناتي فالوب (HyCoSy)

لقد أحالك طبيبك لإجراء أحد هذين الفحصين أو كليهما. توضّح صحيفة المعلومات هذه ما هي هذه الفحوص ولم يُطلب منك إجراءها، وما يمكنك توقعه قبل الفحص وأثناءه وبعده.

ما هو تصوير الظليلي للرحم وقناتي فالوب بالموجات فوق الصوتية (HyCoSy)؟

تسمح لنا تقنية التصوير الظليلي بالموجات فوق الصوتية للرحم وقناتي فالوب برؤية ما إذا كانت قناتي فالوب عندك مسدودتين. قد تؤدي الانسدادات إلى صعوبة الحمل لأن البويضات تحتاج إلى الانتقال من المبايض عبر القناة إلى الرحم.

لإجراء هذا الفحص توضع صبغة رغوية خاصة في الرحم. تظهر هذه الرغوة بوضوح على صور الموجات فوق الصوتية ونستطيع مشاهدتها وهي تتحرك عبر قناتي فالوب، وبالتالي سنتسطيع تحديد أي مشكلات صحية.



رغوة في الرحم

رغوة في الأنبوب

تحديد مواعيد الفحوص

من الممكن أن تجري كلا الفحصين في ذات اليوم.

سنهدف إلى إجراء هذه الفحوص في حوالي اليوم العاشر من دورتك الشهرية لضمان أنك لست حاملاً. سوف يتصل بك موظفونا لحجز موعد لكي تتصلي بنا وترتبي موعد الفحوص الخاصة بك. إذا كانت دورتك الشهرية غير منتظمة أو إن كنت غير متأكدة من موعد اليوم العاشر من دورتك الشهرية فيرجى الاتصال بنا.


ما هو التصوير بالموجات فوق الصوتية مع المحلول الملحي (SIS)؟

تسمح لنا تقنية الموجات فوق الصوتية مع استخدام المحلول الملحي برؤية ما في داخل الرحم.

أثناء فحص الموجات فوق الصوتية، نقوم بوضع الماء المالح المعقم (محلول الملح) في الرحم. يساعدنا هذا المحلول على رؤية البطانة الداخلية للرحم بشكل أوضح.

يُنصح بإجراء هذا الفحص في الحالات التالية:

- حالات إجهاض متكررة
- دورات شهرية مؤلمة وكثيفة
- وجود تورّم غير سرطاني في الرحم، مثل الأورام الليفية أو سلائل الرحم.



الأعلى - قبل حقن المحلول الملحي

الأسفل - بعد حقن المحلول الملحي




يجب ألا تجري فحصي SIS أو HyCoSy في الحالات التالية:

- كنت حامل
- تعانين حاليًا أو كنت مصابة مؤخرًا بالتهاب في أعضاء منطقة الحوض
- لديك نزيف مهبطي غير طبيعي وغير مبرر
- لقد عانيت رد فعل تحسسي للرغوة في السابق.

الأسئلة الشائعة

1. هل الموجات فوق الصوتية آمنة؟
نعم، الموجات فوق الصوتية آمنة، ولا يوجد دليل على أنها ستؤذي.
2. هل الفحوص مؤلمة؟
يشعر معظم الأشخاص بانزعاج خفيف في مراحل مختلفة من إجراءات الفحص، ولكن إذا زاد الأمر أكثر من اللازم بالنسبة لك، فيمكننا التوقف.
3. هل يمكن تناول أدوية مسكنة للألم قبل أو بعد الفحص؟
نوصي بتناول دواء مسكن للألم خفيف مثل الباراسيتامول قبل الفحص بحوالي 30 دقيقة. تحدثي مع طبيبك بشأن هذا الموضوع.
4. كيف تحسبين "اليوم العاشر" إذا كانت دورتك الشهرية غير منتظمة للغاية؟
إذا كانت دورتك الشهرية غير منتظمة فيرجى الاتصال بنا لمناقشة أفضل وقت لحجز موعد الفحص الخاص بك.
5. هل من الآمن أن يحدث الحمل في ذات الشهر بعد إجراء SIS أو HyCoSy؟
نعم، لا خطر على الحمل.
6. هل يمكن أن تكون لديك حساسية من الرغوة؟
تعتبر ردود الفعل التحسسية تجاه الرغوة نادرة. يتم إجراء العملية في بيئة آمنة، لذلك يمكننا علاج أي رد فعل تحسسي على الفور.
7. هل هناك أي مخاطر من فحصي SIS أو HyCoSy؟
هناك خطر ضئيل لدخول البكتيريا (الجراثيم) إلى منطقة الحوض أثناء الفحص. إن تنظيف المهبل وعنق الرحم في بداية العملية يقلل من ذلك. ويبلغ خطر الإصابة بالتهاب حوالي 1 من كل 100 شخص، أو 1%.



1. أولاً، سيقوم الطبيب بإدخال مسبار الموجات فوق الصوتية إلى المهبل لفحص الرحم والمبايض. يُطلق على هذا الفحص اسم فحص الموجات فوق الصوتية المهبليّة الداخلية.
 2. بعد إجراء التصوير بالموجات فوق الصوتية، سيقوم الطبيب بإزالة المسبار واستخدام موسّع المهبل لإبقاء المهبل مفتوحًا، كما هو الحال عند إجراء فحص مسحة عنق الرحم. سيقوم الطبيب بتنظيف المهبل وعنق الرحم بمحلول مطهر. قد يكون هذا الأمر مزعجًا بعض الشيء.
 3. بعد ذلك، سيقوم الطبيب بإدخال أنبوب صغير (قسطرة) من خلال عنق الرحم إلى الرحم. سيتم نفخ بالون صغير على القسطرة لإبقائها في مكانها. وقد يكون هذا مزعجًا أيضًا. يشعر بعض الأشخاص بالدوخة أو الإغماء، ولكن هذا ليس أمرًا شائعًا.
 4. سيقوم الطبيب بعد ذلك بإدخال الماء أو الرغوة، أو كليهما، من خلال القسطرة، ومن ثم تصوير الرحم وقناتي فالوب. قد يسبب هذا بعض الانزعاج ولكن عادة ما يمكن تحمله بشكل جيد. إذا أصبح الأمر مؤلمًا للغاية فأخبرينا، وسنوقف الفحص.
 5. سيقوم طبيبك بشرح النتائج لك في ذات اليوم.
- تجنبي ممارسة الجنس والحمامات والسباحة لمدة 24 ساعة بعد الفحص.

دعم العنف الأسري

Respect1800 خط المساعدة الوطني

دعم الأشخاص المتضررين من الاعتداء الجنسي أو العنف المنزلي أو العائلي أو الإساءة.

1800 737 732 (خدمة دعم على مدار 24 ساعة)

1800respect.org.au

هل تحتاجين إلى مترجم؟

إذا كنت بحاجة إلى مترجم فيمكنك أن تطلبي ذلك.



8. كيف تعرفين أنك مصابة بالتهاب الأعضاء الحوضية؟

تشمل الأعراض الشائعة الألم أو الانزعاج في أسفل البطن، أو إفرازات مهبلية كريهة الرائحة، أو الشعور بالإعياء بشكل عام في الأيام التي تلي الفحص.

9. ماذا يجب عليك فعله إذا كنت تعتقدين أنك مصابة بالالتهاب يرجى مراجعة طبيب العائلة الخاص بك. يمكن أن يؤدي الالتهاب غير المعالج إلى تفاقم مشكلات الخصوبة.

10. هل النزيف الخفيف بعد العملية أمر طبيعي؟ نعم، إن نزول بقع خفيفة من الدم لمدة 1-2 يوم بعد الفحص أمر طبيعي.

إخلاء المسؤولية: تقدم صحيفة المعلومات هذه معلومات عامة فقط. للحصول على نصائح محددة بشأن احتياجاتك الصحية، يجب عليك استشارة أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك. لا يتحمل مستشفى النساء الملكي أي مسؤولية عن الخسارة أو الضرر الناتج عن اعتمادك على هذه الصحيفة بدلاً من رؤية أخصائي الرعاية الصحية. إذا كنت بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة فيرجى الاتصال بقسم الطوارئ الأقرب إليك.

© The Royal Women's Hospital 2024.